

Prueba de glucosa en orina

¿Cómo hago la prueba?

Si su hijo usa pañales, ponga una bola de algodón en el pañal limpio de su hijo cuando lo cambie. La bola de algodón absorberá la orina que se va a analizar.

Si su hijo usa el inodoro, ayúdelo a recoger una pequeña cantidad de orina en una taza. Su hijo no debe orinar directamente sobre la tira reactiva.

1. Cuando el pañal de su hijo esté mojado y listo para ser cambiado o su hijo haya orinado en la taza, saque una tira reactiva del frasco. No toque el extremo inferior de la tira reactiva.

Para analizar la orina en la tira reactiva:

- Exprima la orina de la bola de algodón sobre la tira reactiva o pase la bola de algodón húmeda por la tira reactiva.
- Sumerja la tira reactiva en la taza de orina. Golpee la tira en el borde de la taza para sacudir el excedente de orina.
- Si hay caca en la orina, no la analice. Necesitará una nueva muestra de orina.

2. Espere 30 segundos. Compare el color del extremo de la tira con la tabla de colores del frasco.

Lleve un registro de todos los resultados y llévelos a la clínica de su hijo.

Por ejemplo:

Fecha	Glucosa
6/15 8:00 a. m.	Negativo
6/15 5:00 p. m.	Negativo
6/16 9:00 a. m.	Negativo

Hay diferentes marcas de tiras reactivas, entre ellas Diastix.



Información especial

- Su médico o enfermero/a le dirán cuándo debe examinar la orina de su hijo y cuáles deberían ser los resultados.
- Guarde el frasco de tiras reactivas tapado. Mantenga el frasco en un lugar seco, lejos de la luz solar, el calor y la humedad.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, al personal de enfermería o a la clínica si tiene cualquier inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. No reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.