

Epilepsia rolándica benigna (BRE, por sus siglas en inglés) o epilepsia benigna con espigas centrotemporales (BECTS, por sus siglas en inglés)

¿Qué es la epilepsia rolándica benigna?

- La epilepsia rolándica benigna es la forma más común de epilepsia observada en la infancia. Suele darse en familias y afecta al doble de niños que de niñas.
- Los niños con epilepsia rolándica benigna tienen convulsiones parciales. Las convulsiones parciales son movimientos focales de la cara, brazos o piernas. Estas convulsiones pueden causar babeo o hacer que su hijo no pueda hablar. Es posible que siga una convulsión de sacudida de cuerpo entero.
- Normalmente, estas convulsiones no ocurren con frecuencia. A menudo, son causados por la falta de sueño.
- Estas convulsiones normalmente ocurren justo después de quedarse dormido o justo antes de despertar.
- La mayoría de los niños superan las convulsiones en la adolescencia.

¿Cómo se diagnostica?

La descripción de las convulsiones es muy importante para diagnosticar la epilepsia rolándica benigna. Se realiza un electroencefalograma, mientras el niño está despierto y dormido, para observar la actividad de las ondas cerebrales. Esto ayuda a confirmar el diagnóstico. Es posible que su hijo también necesite una resonancia magnética para detectar cualquier anomalía cerebral que pueda estar causando las convulsiones.

¿Cuál es el tratamiento?

Se pueden usar medicamentos para tratar las convulsiones. El proveedor de salud le dirá si se recomiendan medicamentos para su hijo. Las dosis de medicamentos para las convulsiones se ajustarán lentamente hasta que se encuentre un nivel de control de las mismas. Se pueden realizar análisis de laboratorio regulares para medir los niveles de medicamentos y ver si se presentan posibles efectos secundarios.

Su hijo aún puede tener convulsiones mientras toma medicamentos anticonvulsivos. Es importante saber cómo cuidar a su hijo durante una convulsión. Es muy importante asegurarse de que el entorno de su hijo sea seguro. Dado que la mayoría de las convulsiones en la epilepsia rolándica benigna ocurren mientras se duerme o al despertar, es importante que no haya nada en la cama o en la habitación que pueda dañar a su hijo. Su hijo no debe dormir en la parte superior de una litera.

Dónde obtener más información

Sociedad Americana de Epilepsia www.aesnet.org 342 N. Main Street West Hartford, CT 06117-2507	Fundación Americana para la Epilepsia www.efa.org
---	---

ALERTA: Llame al médico, enfermera o clínica de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud o si su hijo:

- Está teniendo más ataques que antes.
- No puede tomar el medicamento recetado.
- Tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.