

## Tratamientos con nebulizador con mascarilla traqueal

### Propósito

- Administrar medicamentos que tratan la sibilancia al respirar y que movilizan las secreciones.
- Administrar corticoesteroides y antibióticos inhalables.
- Otra fuente de humedad.

### Materiales necesarios

- Máquina nebulizadora
- Medicamentos
- Equipo del nebulizador
  - Recipiente del nebulizador
  - Pieza en T
  - Cánula de oxígeno transparente



### Preparación del tratamiento

1. Lávese las manos.
2. Arme el recipiente del nebulizador con un giro fuerte.
3. Se le pueden agregar medicamentos desde arriba.
4. Sujete con cinta adhesiva un extremo de la pieza en T.
5. Ponga la pieza en T encima del recipiente del nebulizador.
6. Conecte el nebulizador a la máquina usando la cánula de oxígeno transparente.
7. Use la sonda flexible de 6 pulgadas y la mascarilla traqueal proporcionadas durante la instalación del collar traqueal.
7. Encienda la máquina.

**Nota:** Si su hijo usa oxígeno, use su oxígeno en vez de la máquina nebulizadora, **aumente el flujo a 6 u 8 LPM.**

## **Limpieza del equipo**

### **Después de cada tratamiento**

1. Coloque al niño otra vez en el equipo que uso antes (por ejemplo, un collar traqueal).
2. Enjuague el recipiente y la pieza en T con agua tibia.
3. Deje secar al aire sobre un paño limpio.

### **Todas las noches**

1. Lave el recipiente y la pieza en T con agua tibia con jabón.
2. Enjuague bien.
3. Deje secar al aire sobre un paño limpio.

### **Una vez a la semana**

Reemplace el equipo del nebulizador.

## **Instrucciones especiales**

Siga las indicaciones del proveedor de servicios de salud domiciliarios de su hijo si usa más de un equipo del nebulizador a la semana.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**