

## ¿Qué necesito saber?

- Mantenga el área de inserción del catéter limpia y seca. Cuando llegue a casa, quite el vendaje inmediatamente y ponga una curita Band-Aid®. Cambie la curita Band-Aid® por lo menos una vez al día hasta que se haya cicatrizado el área de la inserción. Cambie inmediatamente la curita Band-Aid® si el área se llega a humedecer o ensuciar.
- Si el punto se ensucia con orina o excremento, lave suavemente el área con un paño húmedo con agua y jabón. Luego, seque la piel alrededor del área y ponga una BandAid® limpia.
- El área no se debe sumergir en agua durante unos 2 a 3 días o hasta que se forme una costra en la piel. Su hijo no debe bañarse en la bañera ni nadar durante este período. Espere un mínimo de 5 días antes de nadar en un lago o en agua no clorinada.
- Puede aparecer un pequeño moretón o haber un poco de dolor en el área durante las primeras 24 horas. Esto es normal, el moretón puede durar de 7 a 10 días.

## ¿Qué puede hacer y comer mi hijo?

El médico o enfermera de su hijo le dirá cuándo puede volver a la escuela y cuándo retomar sus actividades diarias. La mayoría de los niños lo pueden hacer el día después del procedimiento. Su hijo no tendrá que seguir dietas especiales.

## ¿Qué tipo de seguimiento se necesita?

Tendrá que programar una cita de seguimiento con el médico de su hijo.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si:

- Muestra señales de infección, como enrojecimiento o hinchazón, alrededor del área.
- Tiene secreción amarilla o verde en el área;
- Pierde el apetito;
- Tiene una temperatura superior a 38.3° C (101° F) o rectal superior a 37.8° C (100° F);
- Tiene necesidades especiales de salud que no se incluyeron en esta información.

**Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:**

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**