

## (Tabla para el medicamento)

- Puede tomar acetaminophen (Tylenol) cada 4–6 horas. Lea todas las etiquetas de los medicamentos para asegurarse de no tomar más de un medicamento que contenga acetaminophen a la vez.
- A la mayoría de los niños se les receta narcóticos, como oxycodone, cuando tienen dolor intenso. Si el oxycodone también contiene acetaminophen indicado en la etiqueta del medicamento, no administre más acetaminophen durante 4 horas. Si tiene preguntas, hágaselas al farmacéutico.
- Si tiene preguntas sobre este u otro medicamento, hable con su médico.

### Día 1

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

### Día 2

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

### Día 3

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

# Irse a casa con medicamento



## Día 4

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

## Día 5

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

## Día 6

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

**Día 7**

Nombre del medicamento	Dosis	Puede darlo cada	Hora en que se le dio					

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:**

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**