



Después de la cirugía, es importante cuidar el área de la herida. Manténgala limpia para prevenir infecciones y ayudar a que sane. El vendaje se puede cambiar antes de salir del hospital. Tendrá que revisarlo varias veces al día. Si los bordes del apósito Aquacel Ag se enrollan, desenróllelo. Coloque tegaderm sobre la orilla para evitar que se enrollen.

Cambie el vendaje **sólo** si la mitad (½) o más está cubierto con secreción. Si el vendaje está bien, no es necesario cambiarlo hasta la próxima visita a la clínica.



El vendaje está bien. No necesita cambiarse.

Si necesita cambiar el apósito, busque estos signos de infección:

- Más enrojecimiento o hinchazón de la herida o piel cerca de la herida.
- Secreción de la herida que moja el vendaje en un período de 24 horas.
- Dolor en el lugar de la herida después de 7 a 10 días desde el momento en que su hijo dejó el hospital.
- Fiebre de 101.5 °F (38.3 °C) o superior que no sea producto de ninguna otra enfermedad.

Llame al médico de su hijo si observa cualquiera de estas señales de infección.



El vendaje necesita cambiarse.

Materiales para cambiar el apósito, si es necesario:

Parte superior de la pierna, cadera o espalda	Pantorrilla
<ul style="list-style-type: none">• Cualquier cinta médica	<ul style="list-style-type: none">• Vendaje Ace™
<ul style="list-style-type: none">• Gasa de 3 "x 3" o 4 "x 4"	<ul style="list-style-type: none">• Gasa de 3 "x 3" o 4 "x 4"

Puede comprar estos materiales en cualquier farmacia.

Para cambiar el vendaje:

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Presione la piel con una mano y levante con cuidado la orilla del vendaje con la otra mano.
3. Estire el vendaje para liberar el sello. Continúe utilizando este método de tirones suaves para retirar todo el vendaje. Téirlo a la basura
4. Revise la herida en busca de enrojecimiento, secreción o cualquiera de los otros signos de infección mencionados anteriormente.
5. Lávese las manos con agua y jabón.
6. Cubra la herida con una gasa y un vendaje Ace o una gasa y cinta adhesiva. Esto dependerá del lugar de la herida.

7. Haga una cita para que le revisen la herida y le pongan un nuevo apósito. Llame a la línea de enfermería de la Clínica Ortopedia al 414-266-2411. O puede enviar una foto del vendaje o de la incisión a través de MyChart.
8. Lávese las manos después de cambiar el vendaje.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.