

## ¿Qué es el priapismo?

El priapismo es una erección prolongada y, a veces, dolorosa del pene. Esta no es una erección normal. El priapismo se produce cuando los glóbulos rojos se pegan entre sí en el pene. La sangre queda atrapada y no sale.

## ¿Cuáles son los síntomas?

Existen 3 tipos de priapismo. Los síntomas son un poco diferentes para cada tipo.

1. **Prolongado.** Esta es una erección dolorosa que dura más de 30 minutos.
2. **Intermitente.** Esta es una erección dolorosa que puede ir y venir durante varias horas.  
**Si su hijo tiene una erección dolorosa y que persiste durante 30 minutos, llévelo a la Sala de Urgencias.**
3. **Persistente.** Esta es una erección que puede durar más tiempo. Normalmente, no hay dolor con este tipo.

Si su hijo tiene una erección prolongada, pero no siente dolor, llame al Centro de tratamiento de anemia drepanocítica. Ellos pueden ayudar a determinar qué hacer.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Centro de tratamiento de anemia drepanocítica:** (414) 266-2420, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. **Pida hablar con una enfermera.**

**Después del horario de atención, fines de semana o festivos,** llame al (414) 266-2000 y pida hablar con el hematólogo de turno.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**

