

Oxicodona (Oxycodone) líquida



¿Qué es la oxicodona y qué debo saber sobre este medicamento?

La oxicodona es un medicamento opiode contra el dolor muy fuerte. Opiode es otro nombre para narcótico. Se debe usar sólo después de haber intentado otros métodos de control del dolor.

- La oxicodona se le debe dar a su hijo si tiene mucho dolor que no se pueda controlar con acetaminophen, ibuprofen u otros métodos.
- No se debe necesitar la oxicodona por más de unos cuantos días.

El acetaminophen (Tylenol®) y el ibuprofen (Motrin® o Advil®) son medicamentos contra el dolor muy buenos. Pídale al médico información sobre cómo usarlos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

- Aumento de la somnolencia o problemas para respirar. **Llame al 911 si su hijo está demasiado adormilado, no se despierta fácilmente, tiene problemas para respirar o cara o labios hinchados.**
- Movimientos o pensamiento lento. Tenga cuidado cuando su hijo necesite estar alerta.
- Salpullido o urticaria. Deje de darle este medicamento y llame al médico de su hijo.
- Comezón. Llame al médico de su hijo.
- Malestar estomacal. Dele este medicamento con alimentos.
- Estreñimiento. Vea las hojas educativas: [Tratamiento del dolor en casa](#) y [Estreñimiento](#).
- Problemas para hacer pipí (orinar). Llame al médico de su hijo.

¿Cómo administro este medicamento?

- Sólo dele oxicodona si su hijo está despierto, alerta y tiene mucho dolor. **Nunca** despierte a su hijo para darle opioides.
- Siga las indicaciones de su médico. **Nunca** le dé el medicamento más seguido de lo que le diga el doctor.
- Agíte bien el medicamento antes de usarlo.
- Use una jeringa para medir el medicamento. Pídale una al farmacéutico.
- Separe las partes de la jeringa y lávelas con agua tibia después de cada uso. Deje que se sequen al aire.





La dosis de su hijo es _____ mL = _____ mg.

Esta dosis se basa en el peso de su hijo y cambiará con el tiempo.

- Si su hijo todavía tiene mucho dolor después de tomar el medicamento, llame al médico.

Escriba la hora a la que le dio el medicamento. Es posible que no necesite todos los recuadros.

Día 1						
Día 2						
Día 3						

Jeringa de 1 mL	
Jeringa de 3 mL	
Jeringa de 5 mL	
Jeringa de 10 mL	

¿Cómo uso, almaceno y desecho este medicamento de manera segura?

- Mantenga todos los medicamentos en un lugar elevado y fuera del alcance o bajo llave para mantener seguros a los niños. Sólo las personas que necesitan administrar estos medicamentos deben saber en dónde están. Incluso, un adulto debe darles este medicamento a los adolescentes.
- Nunca comparta medicamentos con receta con otras personas. Esto es peligroso. Puede causar daños graves y muertes. Es también contra la ley.
- Deshágase de los medicamentos que no use. No los guarde.
- Cuando su hijo ya no necesite este medicamento, llévelo a un lugar donde se puedan regresar medicamentos. Algunas farmacias y estaciones de policía aceptan medicamentos de sobra. El sitio web Dose of Reality: <https://bit.ly/2Hqp0hz> lo puede ayudar a encontrar un lugar para regresarlos.
- No los tire en el lavabo, escusado ni basurero.

Otras hojas de enseñanza que pueden ser de ayuda:

- #[1118](#) Seguridad relacionada con opioides
- #[1763](#) Tratamiento del dolor en casa
- #[1619](#) Cómo leer una jeringa oral
- #[1844](#) Estreñimiento

ALERTA: Llame al 911 si su hijo está demasiado adormilado, no se despierta fácilmente, tiene problemas para respirar o cara o labios hinchados. Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier otra inquietud.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.