

¿Qué es la epinefrina?

La **epinefrina** es un medicamento que se utiliza para detener o disminuir una reacción alérgica grave que pueda poner en riesgo la vida. El medicamento funciona muy rápido y se administra con un aparato que se llama autoinyector de epinefrina (EAI, por sus siglas en inglés), que inyecta el medicamento al cuerpo cuando se usa correctamente.

¿Cuándo se debe usar el autoinyector de epinefrina (EAI, por sus siglas en inglés)?

1. Síntomas ligeros **en más de un** área del sistema corporal. Estos síntomas incluyen:
 - **Nariz:** Esguince nasal, estornudos, comezón.
 - **Boca:** Comezón en la boca.
 - **Piel:** Un poco de urticaria, comezón ligera.
 - **Estómago:** Náusea o molestia ligera, vomitar una vez (más de una vez se considera un síntoma grave).
2. Cualquiera (**uno**) de los siguientes síntomas graves:
 - **Pulmones:** Falta de aliento, sibilancia o tos que no para.
 - **Corazón:** Pálido, morado, desmayos, pulso débil, mareos.
 - **Garganta:** Garganta cerrada, ronquera, dificultad para tragar y respirar.
 - **Boca:** Hinchazón severa de la lengua o los labios.
 - **Piel:** Mucha urticaria en el cuerpo, enrojecimiento extendido.
 - **Estómago:** Vómito constante o diarrea grave.
 - **Otro:** Sensación de que algo malo va a pasar, ansiedad o confusión.
 - **O una combinación** de cualquiera de estos síntomas en diferentes partes del cuerpo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del autoinyector de epinefrina?

- Ritmo cardíaco rápido, latidos del corazón fuertes (palpitaciones), temblores, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, mareos, palidez o piel enrojecida (ruborizada), debilidad, nerviosismo o ansiedad.




Información especial

- Siempre tenga 2 autoinyectores de epinefrina con usted en todo momento. Lívelos a la escuela, de regreso a casa y a cualquier parte a donde vaya. Todos los tipos de autoinyectores de epinefrina vienen en paquetes de 2. Manténgalos juntos, no los separe.
- No retire la tapa de seguridad a menos que vaya a usar el medicamento.
- Use el segundo autoinyector de epinefrina para administrar una segunda dosis si no mejoran los síntomas después de 5 minutos. No dañará al paciente si debe administrar la segunda dosis antes de que se cumplan los 5 minutos.

Almacenamiento, volver a surtir y eliminación del medicamento


- **Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.** No permita que nadie más tome este medicamento.
- No guarde el medicamento en el refrigerador. No lo exponga a la luz solar directa ni a temperaturas extremas, como en la guantera del auto.

- Reemplace el medicamento si está vencido o si se ve descolorado.
- Todos los autoinyectores de epinefrina sólo administran una dosis del medicamento. No intente volver a usar el autoinyector.

<p>CÓMO USAR AUVI-Q® (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP), KALEO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saque Auvi-Q del estuche exterior. 2. Jale el protector de seguridad rojo. 3. Coloque el extremo negro en la parte media de la porción externa del muslo. 4. Presione firmemente hasta que escuche un clic y un siseo y mantenga en el sitio durante 2 segundos. 5. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de emergencia. 	
<p>CÓMO USAR EL AUTOINYECTOR DE EPIPEN® y EPIPEN JR® (EPINEFRINA) Y LA INYECCIÓN DE EPINEFRINA (GENÉRICO AUTORIZADO DE EPIPEN®), AUTOINYECTOR USP, AUTOINYECTOR MYLAN, MYLAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire el autoinyector de EpiPen® o EpiPen Jr® del tubo transparente. 2. Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta anaranjada (extremo con la aguja) apuntando hacia abajo. 3. Con la otra mano, quite la tapa azul de seguridad jalándola hacia arriba. 4. Balancee y empuje el autoinyector firmemente en la parte media de la porción externa del muslo hasta que haga "clic". 5. Sostenga firmemente en el sitio durante 3 segundos (cuenta despacio 1, 2, 3). 6. Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos. 7. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de emergencia. 	
<p>CÓMO USAR LA INYECCIÓN DE EPINEFRINA IMPAX (GENÉRICO AUTORIZADO DE ADRENALICK®), AUTOINYECTOR USP, LABORATORIOS IMPAX</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire el autoinyector de epinefrina de su estuche de protección. 2. Jale ambas tapas azules en los extremos: ahora verá una punta roja. 3. Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta roja apuntando hacia abajo. 4. Coloque la punta roja en la parte media de la porción externa del muslo en un ángulo de 90 grados, perpendicular al muslo. 5. Presione fuerte y sostenga firmemente contra el muslo durante aproximadamente 10 segundos. 6. Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos. 7. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de emergencia. 	

**CÓMO USAR EL AUTOINYECTOR GENÉRICO TEVA'S EPIPEN®
(INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP), INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS TEVA**

1. Gire rápidamente la tapa amarilla o verde del autoinyector en la dirección indicada por la "flecha de giro" para retirarla.
2. Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta anaranjada (extremo con la aguja) apuntando hacia abajo.
3. Con su otra mano, quite la tapa azul de seguridad.
4. Coloque la punta anaranjada en la parte media de la porción externa del muslo (parte superior de la pierna) en un ángulo recto (perpendicular) al muslo.
5. Balancee y empuje el autoinyector firmemente en la parte media de la porción externa del muslo hasta que haga "clic".
6. Sostenga firmemente en el sitio durante 3 segundos (cuenta despacio 1, 2, 3).
7. Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos.
8. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de emergencia.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN PARA TODOS LOS AUTOINYECTORES

1. No ponga su dedo pulgar, dedos o mano sobre la punta del autoinyector ni inyecte en ninguna otra parte del cuerpo que no sea la parte media de la porción externa del muslo. En caso de que se inyecte accidentalmente, vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.
2. Si se le administra a un niño pequeño, sostenga su pierna firmemente en su lugar antes y durante la inyección para prevenir lesiones.
3. De ser necesario, se puede administrar la epinefrina a través de la ropa.
4. Llame al 911 inmediatamente después de aplicar la inyección.

OTRAS INDICACIONES E INFORMACIÓN (puede llevar la epinefrina, puede administrársela usted mismo, etc.):

Trate a la persona antes de llamar a los contactos de emergencia. Las primeras señales de una reacción pueden ser ligeras, pero los síntomas pueden empeorar rápidamente.

CONTACTOS DE EMERGENCIA – LLAMAR AL 911	OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA
Escuadrón de rescate _____	Nombre/relación _____ Teléfono _____
Médico _____	Nombre/relación _____ Teléfono _____
Padre o tutor _____	Nombre/relación _____ Teléfono _____