

¿Qué es la funduplicación laparoscópica?

- El reflujo gastroesofágico (GE) ocurre cuando el contenido en el estómago regresa al esófago. Esto puede irritar el esófago. La cirugía por reflujo gastroesofágico resulta necesaria cuando los otros tratamientos no funcionan.
- Laparoscópica significa un tipo de cirugía donde se usan instrumentos especiales y una cámara. Funduplicación significa envolver el estómago alrededor del esófago. Esto evita que el contenido estomacal regrese hacia el esófago.



¿Cómo se realiza la cirugía?

Se realizan varias incisiones pequeñas en el abdomen. Una cámara especial pasa por la incisión cercana al ombligo. La cámara permite que el médico pueda ver durante la operación. Otros instrumentos necesarios para la cirugía se pasarán a través de las demás incisiones. Es posible que a su hijo se le coloque una sonda de gastrostomía de alimentación (sonda G) durante la cirugía. Los niños que no pueden recibir todos los alimentos por vía oral utilizan una sonda de gastrostomía.

La cirugía tardará entre 2 y 3 horas. Normalmente, su hijo permanecerá en el hospital unos cuantos días después de la cirugía.

¿Cómo preparo a mi hijo para la cirugía?

- Antes de la cirugía, su hijo visitará al médico que realizará la operación. El médico explicará cómo se realizará.
- Su hijo puede acudir a la clínica "preoperatoria" en Cirugía Ambulatoria antes de la cirugía. Los médicos o enfermeras especializadas en práctica avanzada de la clínica le explicarán cómo:
 - se puede controlar el dolor de su hijo.
 - lo ayudarán a dormir durante la cirugía.

Los exámenes de sangre también se realizarán ese día, si se necesitan. Para programar una cita, llame al (414) 266-3535.

¿Qué sucederá después de la cirugía?

- Si su hijo se alimenta por vía oral, el médico le dirá cuándo es el momento en que puede comenzar con una dieta blanda. Los alimentos blandos pasarán por el estómago con mucho más facilidad. Es importante que su hijo beba muchos líquidos con las comidas. Esto ayuda a pasar los alimentos hacia el estómago.

- Si su hijo se alimenta a través de una sonda de gastrostomía, deberá aprender cómo alimentarlo y en qué cantidad.
- Un dietista se reunirá con usted para revisar el plan de alimentación de su hijo. Recibirá documentos con información sobre qué es lo que puede comer.
- Para aliviar el dolor, su hijo recibirá analgésicos por vía oral o a través de la sonda de gastrostomía.
- Las cintas de papel, llamadas Steri-Strips®, permanecerán en las incisiones por 7 a 10 días. Si no se caen por sí solas después de 10 días, puede quitarlas.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo:

- presenta dificultades al tragar alimentos;
- vomita los alimentos ingeridos;
- presenta piel enrojecida, hinchada o con secreciones alrededor de las incisiones;
- tiene una temperatura de 101,5° F (38,6° C) o superior;
- presenta enrojecimiento o secreciones en la sonda de gastrostomía;
- tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.