

de gastrostomía o de yeyunostomía

¿Por qué se tiene que retirar la sonda?

El médico de su hijo ha decidido que ya no se necesita la sonda.

¿Cómo se retira la sonda?

Se retirará la sonda. Se colocará un vendaje de presión sobre el sitio de la sonda, que es la abertura en la panza donde se encontraba.

¿Qué es un vendaje de presión?

Es un vendaje apretado y limpio que cubre el sitio de la sonda. Absorbe la supuración del sitio y ayuda a que sane. La mayoría de los tractos cierran en unos cuantos días. Otros pueden demorar unas semanas en cerrar. Si el tracto no cierra por sí solo, es posible que su hijo necesite cirugía. El médico de su hijo le hablará con usted acerca de la cirugía si el tracto no cierra por sí solo.



¿Cuándo debe cambiarse el vendaje de presión?

La mejor hora para cambiar el vendaje es antes de comer cuando el estómago está vacío. El vendaje de presión tiene que cambiarse:

- Por lo menos una vez al día.
- Siempre que esté empapado de supuración.

¿Cómo cambio el vendaje de presión?

1. Reuna los materiales.
 - 2 piezas de gasa de 3 x 3
 - Cinta adhesiva de seda o de espuma
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Limpie el sitio con agua y jabón. Está bien si su hijo se baña en la tina o en la regadera (ducha).
4. Deje que el sitio se seque al aire o puede dar palmaditas suavemente con una toalla para secarlo.
5. Doble el primer pedazo de gasa.
 - Doble a la mitad.
 - Dóblelo otra vez a la mitad. Ahora tiene la forma de un cuadrado.
6. Ponga el primer pedazo de gasa doblado sobre el sitio.
7. Doble el segundo pedazo de gasa.
 - Dóblelo a la mitad. Ahora tiene la forma de un rectángulo.
8. Ponga el segundo pedazo de gasa doblado sobre el primer pedazo de gasa.
9. Coloque la cinta firmemente sobre la gasa y la piel. Asegúrese de que todos los bordes del vendaje estén cubiertos.

Información especial

Para ayudar a controlar la supuración del sitio después de retirar la sonda:

- Su hijo no debe comer ni tomar líquidos por un mínimo de 3 horas.
- Después, su hijo puede comer pequeñas cantidades de fórmula o alimentos durante unos cuantos días.
- Lo mejor es que su hijo juegue tranquilo durante un día.

Para ayudar a que la piel alrededor del sitio permanezca sana:

- Use crema para la rozadura causada por los pañales, como Desitin®, para proteger la piel de las secreciones.
- Limpie la piel con agua y jabón todos los días.
- Séquela bien antes de poner la gasa.

Cuidados de seguimiento después de retirar la sonda

Programe una cita en la Clínica de Cirugía en 2 ó 3 semanas a partir del momento en que le quitaron la sonda. Esta cita es para hablar con el cirujano y decidir si se necesita una cirugía. Es posible que sea necesaria si el sitio no cierra o si hay supuración. Si el sitio cierra antes de esta cita, puede cancelarla.

- Programación Central: 800-607-5280.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si:

- El sitio tiene muchas secreciones después de una semana.
- La piel está muy roja, le duele mucho o si la piel comienza a pelarse.
- Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.