



(Miringoplastia)

La cirugía para reparar una perforación en la membrana del tímpano se llama miringoplastia. Hay dos opciones para reparar la perforación.


- **Parche de papel.** Se coloca un papel especial sobre la perforación.
- **Parche de grasa.** Se usa una pequeña porción de grasa extraída de la parte de atrás del oído para llenar la perforación.

Su médico hablará con usted sobre el mejor procedimiento para su hijo.



¿Qué debo saber antes de la cirugía?

- **No le dé a su hijo estos medicamentos durante al menos 2 semanas antes de la cirugía,** ya que aumentan las probabilidades de sangrado durante y después de la cirugía.
- **Ibuprofen** (Motrin®, Advil®, Pediaprofen®)
- **Naproxen**
- **Aspirina**



Puede darle Tylenol® conforme sea necesario. No deje de darle ningún medicamento recetado sin antes hablar con su médico. Si le recetan antes de la cirugía cualquier medicamento que no sea un antibiótico, comuníquese con nuestra clínica.

- Tratamos de programar las cirugías tan pronto como sea posible. Si no le hemos llamado en 2 semanas, favor de llamar a nuestra clínica.
- Es mejor realizar la cirugía cuando su hijo esté sano. Si su hijo tiene señales de alguna enfermedad, llame inmediatamente al médico o la enfermera. La cirugía podría cancelarse si está enfermo o tiene fiebre. Se puede realizar la operación si su hijo está tomando antibióticos para una infección en el oído.

¿Qué debo saber después de la cirugía?

Qué esperar

Es posible que haya una disminución en la audición hasta que el parche se caiga.

Dolor

Es posible que su hijo tenga un poco de dolor después de la cirugía. Cada niño responde de manera diferente al dolor. Dele acetaminophen (Tylenol) para el dolor cada 4 a 6 horas conforme sea necesario.

Dieta

- Su hijo puede comenzar a tomar líquidos claros cuando esté completamente despierto.
- Puede volver a una dieta regular cuando su hijo tenga hambre y esté listo para comer.

Seguimiento

- Si su hijo todavía no tiene una cita postoperatoria programada, llame al consultorio de su médico.
- El médico examinará a su hijo aproximadamente 1 a 2 semanas después de la cirugía en la Clínica de Otorrinolaringología (ENT).
- Los resultados finales de la cirugía no podrán revisarse por hasta 6 semanas después de la cirugía.

Bañarse en la tina y nadar

- Siga las precauciones estrictas relacionadas con el agua cuando se bañe en la tina y se lave el cabello hasta la cita de seguimiento.
- El médico le dirá cómo cubrir el oído para que no se le meta el agua. Es posible que le digan que use algodón o tapones para los oídos.
- No se permite nadar ni hacer otras actividades en las que pueda entrarle agua al oído.

Actividad

- No debe pujar ni empujar de modo que aumente la presión en el oído, como al pasar deposiciones.
- No podrá sonarse la nariz durante 2 semanas. Intente que mantenga la boca abierta al estornudar.
- No debe realizar deportes extenuantes.
- No debe viajar en avión hasta que se lo permita el médico.
- No debe tocar instrumentos de viento que requieran soplar.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene:

- Dolor intenso.
- Cualquier señal de moretones o sangrado inusual.
- Secreciones cremosas o de mal olor provenientes del oído.
- Fiebre de 101°F (38.3°C) o superior.
- Mareos, malestar estomacal o vomita.
- Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.