

Sonda gastroyeyunal Corflo


(Sonda GY Corflo)

¿Qué es una sonda gastroyeyunal Corflo?

Hay diferentes marcas de sondas gastroyeyunales. La sonda gastroyeyunal Corflo es una de ellas. Es un tipo de sonda larga. Tiene un tope en la parte interna para evitar que se caiga.

Una sonda gastroyeyunal es una sonda de alimentación que pasa por el estómago hasta el intestino. La G es por gástrico, que es el estómago. La Y es por yeyuno, que es parte de los intestinos.

A menudo, se cambia una sonda de gastrostomía por una sonda gastroyeyunal. Esto permite la alimentación en el intestino delgado.



Puertos

Hay tres puertos en la sonda gastroyeyunal Corflo:

1. Puertos yeyunales=Los dos puertos con tapas moradas.

- Estos puertos se usan para administrar alimentaciones, líquidos y medicamentos en el yeyuno.

2. Puerto gástrico=El puerto transparente.

- Algunos niños pueden tolerar el puerto gástrico sujetado con abrazadera. Es posible que otros necesiten ventilarlo o colocarlo hacia abajo. El médico o la enfermera de su hijo lo ayudará a decidir lo mejor para su hijo.

Puerto yeyunal principal. Se utiliza para la administración de medicamentos y alimentaciones. Enjuague de manera habitual. Este es el mejor puerto yeyunal que puede usar ya que es derecho.

Tapa de la sonda de gastrostomía que se usaba antes de que se colocara la sonda yeyunal. **No** la corte. Evitará que las bridas de plástico se deslicen. También podría necesitarla si deja de usar la sonda

El sistema de bridas de plástico que mantiene a la sonda yeyunal en su lugar. **No** quite ninguna de las 3 bridas de plástico. Póngase en contacto inmediatamente con Radiología Intervencionista si nota que faltan o están sueltas cualquiera de las 3 bridas.

2do puerto yeyunal. Este no es el mejor puerto que puede usar. Es más probable que se tape o se doble en el ángulo.

Puerto gástrico



¿Por qué mi hijo tiene una sonda gastroeyunal?

Algunos niños no toleran la alimentación en el estómago. Cuando esto sucede, algunos niños no logran aumentar de peso. Es posible que necesiten ser alimentados pasando el estómago en los intestinos.

Razones por las que se necesita administrar alimentaciones en los intestinos:

• Vaciado lento del estómago	• Náuseas y vómitos durante la alimentación.
• Dolor estomacal intenso.	• Problemas respiratorios.

¿Durante cuánto tiempo mi hijo tendrá una sonda gastroeyunal?

Algunos niños necesitan una sonda gastroeyunal por un periodo corto de tiempo.

Una vez que le hayan colocado la primera sonda gastroeyunal, usted administrará las alimentaciones por el puerto yeyunal. Cuando esas alimentaciones se realicen sin problemas, intentará alimentarlo por el puerto gástrico. Algunos niños podrán ser alimentados en el estómago más tarde. Si su hijo tolera la alimentación en el estómago, ya no necesitará la sonda gastroeyunal y se podrá cambiar por una sonda de gastrostomía (sonda G).

Si su hijo necesita una sonda gastroeyunal durante más de 6 a 12 meses, el médico tal vez hable con usted sobre la posibilidad de una yeyunostomía permanente (sonda yeyunal).

Cuidados especiales para la sonda gastroeyunal Corflo

Visite www.childrenswi.org/gtube para ver videos sobre los cuidados de un niño con una sonda gastroeyunal.

No gire la sonda gastroeyunal, ya que esto puede causar que se tuerza o que se mueva fuera de lugar. Está bien si se mueve o gira por sí sola.

Alimentaciones

Siempre administre alimentaciones continuas con la bomba de alimentación cuando alimente a su hijo a través del puerto yeyunal. Nunca administre una cantidad grande en un periodo corto de tiempo en los intestinos, ya que estos no pueden tolerar una gran cantidad de fluidos a la vez. Si las alimentaciones son muy rápidas o considerables, es posible que su hijo vomite, haga mucha popó o tenga dolor estomacal.

Medicamentos

Pregúntele al médico de su hijo si debe administrar el medicamento por el puerto gástrico o por el puerto yeyunal.

Los medicamentos funcionan mejor si se administran en forma líquida. Las pastillas trituradas y los medicamentos espesos pueden tapar fácilmente la sonda. Si necesita darle una pastilla, tritúrela hasta obtener un polvo fino y mézclela con suficiente agua hasta que esté uniforme. Enjuague la sonda antes, después y entre cada medicamento.

Enjuague

Las sondas gastroyeyunales se deben enjuagar a menudo para evitar que se tapen.

- Enjuague el puerto yeyunal con 2 a 5 mL de agua. Es importante hacerlo cada 4 horas, incluso si la alimentación está en curso.
- Enjuague el puerto yeyunal antes, después y entre cada medicamento.
- Si su hijo hace una pausa entre alimentaciones, enjuague después de terminar la alimentación.
- Si los líquidos del puerto gástrico se mueven lentamente, enjuague la sonda con 2 a 5 mL de agua por lo menos una vez al día. Pregúntele al médico o enfermera de su hijo si esto ayudaría.

Cambios de rutina de las sondas gastroyeyunales

Las sondas gastroyeyunales se deben remplazar en Radiología Intervencionista (IR, por sus siglas en inglés) cada 3 a 4 meses.

- Llame de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. al (414) 266-3152 para programar el cambio.

¿Qué problemas pueden ocurrir con una sonda gastroyeyunal?

Raramente, la sonda puede ocasionar un hoyo en los intestinos. **Esto es una emergencia**. Busque ayuda inmediatamente. **Las señales incluyen fiebre y dolor estomacal intenso**.

Puede ser alarmante, pero no es una emergencia si la sonda gastroyeyunal presenta un problema:

- No venga a la Sala de Emergencias a menos que sea necesario. Lo mejor es llamar a Radiología Intervencionista primero. Si viene a la Sala de Emergencias en la tarde noche o en la noche, la sonda gastroyeyunal de su hijo no se remplazará hasta el día siguiente.
- Lo mejor es llamar a Radiología Intervencionista si no sabe qué hacer.
- Si se presentan problemas que requieran el cambio de sonda, llame a uno de los números abajo.
- Si ocurre un problema durante el horario regular de citas, llame inmediatamente.
- Si ocurre un problema después del horario laboral o en fin de semana, llame a Radiología Intervencionista la mañana siguiente para que le cambien la sonda gastroyeyunal.

Día	Hora	Teléfono de Radiología Intervencionista
Lunes a viernes	Horario de programación de citas 8:00 a.m. – 4:00 p.m.	(414) 266-3152
Fuera del horario laboral entre semana y fines de	Después de las 4:00 p.m.	(414) 266-3116

Cada niño tiene un plan diferente hasta que se pueda arreglar o cambiar la sonda gastroyeyunal. La mayoría de los niños pueden estar 12 horas sin alimentaciones ni líquidos sin que les perjudique. Esto depende de la edad y necesidades médicas especiales de su hijo. Su médico o enfermera hablará con usted sobre el plan de alimentación emergente de su hijo.

- Algunos niños pueden tolerar alimentaciones lentas o Pedialyte en su estómago.
- Algunos niños no toleran nada en el estómago pero pueden esperar a que les cambien la sonda gastroyeyunal.
- Algunos niños pueden necesitar fluidos por vía intravenosa. Es posible que su hijo tenga que ingresar al hospital si la sonda gastroyeyunal no funciona.

Problema	Causas	Solución
<p>La sonda gastroyeyunal está tapada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se atoró el medicamento en la sonda. • Los alimentos o la fórmula se acumularon en la sonda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intente enjuagar el puerto con agua tibia, agua con gas o agua de Seltz. Use una jeringa de 3 mL y empuje y jale el émbolo para ayudar a que se destape la sonda. Puede ser de ayuda dejar que el agua permanezca en la sonda durante 20 minutos e intentarlo de nuevo. No use refresco ni jugos para destapar la sonda. • Si después de intentar lo anterior, todavía no puede enjuagar el puerto yeyunal, llame al médico de su hijo o a Radiología Intervencionista
<p>La sonda gastroyeyunal se salió</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalaron la sonda. • El globo se desinfló o se rompió. 	<p>Si esta es la primera sonda de su hijo y nunca se la han cambiado antes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No trate de poner nada en el tracto. Cubra el estoma. • Si sucede de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., llame a Radiología Intervencionista. • Después de las 4:00 p.m. o en fines de semana, traiga a su hijo a la Sala de Emergencias.

<p>La sonda gastroyeyuna l se salió</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalaron la sonda. • El globo se desinfló o se rompió. 	<p>Si esta no es la primera sonda de su hijo y se la han cambiado antes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si tiene una sonda gastroyeyunal de repuesto: <ul style="list-style-type: none"> • Reemplácela si le enseñaron cómo hacerlo. • Si pudo colocar la sonda gástrica adentro y le dijeron que su hijo posiblemente pueda tolerar alimentaciones lentas o Pedialyte en el estómago, puede intentar esto. Llame a Radiología Intervencionista para programar el cambio de la sonda gastroyeyunal. 2. Si no tiene una sonda gastroyeyunal de repuesto: <ul style="list-style-type: none"> • Intente poner la punta de la sonda gastroyeyunal en el tracto 2 pulgadas adentro y asegúrela con cinta en su lugar. Esto evitará que se cierre el tracto. • Si no puede poner nada en el tracto, llame a Radiología Intervencionista o al
<p>Si parte de la sonda gastroyeyunal se sale</p> <p>Es posible que su hijo vomite fórmula o tenga dolor estomacal si esto sucede.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sonda que se colocó en los intestinos se pudo haber torcido o movido hacia el estómago. • La sonda yeyunal se pudo haber salido del puerto. • Se aflojaron las bridas de plástico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le dijeron que su hijo posiblemente pueda tolerar alimentaciones lentas o Pedialyte en el estómago, puede intentar esto. Llame a Radiología Intervencionista para programar el cambio de la sonda gastroyeyunal.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.