


Cirugía de los senos paranasales

(Cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales)

¿Qué son los senos paranasales?

Son espacios llenos de aire en el rostro y la cabeza. Cuatro pares de senos paranasales conectan a la nariz mediante pequeñas vías de drenaje. Los senos paranasales saludables producen mucosidad que se drena hacia la nariz. La nariz también produce mucosidad. La inflamación crónica puede bloquear el flujo de mucosidad a través de la nariz o los senos paranasales. Es posible que esto provoque el desarrollo de bacterias que podría resultar en una infección de los senos paranasales (sinusitis).



¿Qué es la cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales (FESS, por sus siglas en inglés)?

- La cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales (FESS, por sus siglas en inglés) se usa para abrir los conductos bloqueados entre los senos paranasales y la nariz, lo que ayudará a que drene la mucosidad. Se usará un pequeño tubo con una luz y una cámara llamado endoscopio para ver el interior de la nariz. También se usará el endoscopio y otras herramientas para limpiar o abrir los conductos bloqueados. Después de esta cirugía, la mucosidad drenará con más facilidad y el aire podrá circular mejor.
- La cirugía se realiza en la sala de operaciones y dura de una a tres horas, dependiendo de cuánta infección se encuentre. Se le administrará un medicamento a su hijo para que duerma durante la cirugía.
- La mayoría de los niños se van a casa el mismo día.

¿Qué debo saber antes de la cirugía de mi hijo?

- No le dé a su hijo estos medicamentos durante al menos las dos semanas previas a la cirugía. Estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante la cirugía.
 - Ibuprofen (Motrin®, Advil®, Pediaprofen®)
 - Naproxen
 - Aspirina
- **Le puede dar Tylenol** conforme sea necesario. No deje de darle medicamentos recetados sin antes hablar con su médico. Si a su hijo le recetan cualquier medicamento que no sea un antibiótico antes de la cirugía, comuníquese a nuestra oficina.
- Tratamos de programar las cirugías tan pronto como sea posible. Si no tiene noticias nuestras en 2 semanas, favor de llamar a nuestro consultorio.
- La cirugía se realiza cuando su hijo está sano. Si su hijo presenta síntomas de alguna enfermedad, llame inmediatamente al médico o la enfermera. Se podría cancelar la cirugía si su hijo está enfermo o tiene fiebre.

¿Qué debo saber después de la cirugía de mi hijo?

Qué esperar:

- Su hijo podría sentir el interior de la nariz tapado o adolorido.
- Es posible que su hijo tenga una secreción nasal rosada tenue o roja oscura durante 3 a 5 días después de la cirugía.
- Su hijo podría sentir como si tuviera algo en la nariz.
- Su médico le dirá si necesita usar un aerosol nasal.
- Su médico le dirá cuándo puede volver a administrar cualquier medicamento nasal.

Dolor

- Es posible que su hijo tenga adolorida la nariz después de la cirugía.
 - Le puede dar acetaminophen o ibuprofen para el dolor conforme sea necesario.
 - Es posible que su médico recomiende otros medicamentos contra el dolor para su hijo.
- Asegúrese de seguir las indicaciones en la etiqueta de la botella de todos los medicamentos que le dé a su hijo.

Dieta

- Cuando su hijo esté completamente despierto, puede tomar líquidos claros.
- Puede comenzar una dieta normal una vez que su hijo tenga hambre y esté listo para comer.

Actividad

- Su hijo debe sonarse la nariz con suavidad durante la 1 a 2 semanas después de la cirugía.
- Es posible que su hijo deba permanecer en casa y no ir a la escuela durante 3 a 5 días.
- No debe realizar deportes de contacto ni nadar durante 2 semanas después de la cirugía.
- Su hijo podrá jugar normalmente cuando el dolor y las molestias mejoren.

Cuidado de seguimiento

Si su hijo todavía no tiene una cita programada después de la operación, llame al consultorio del médico. Necesitan revisar a su hijo en la Clínica de Otorrinolaringología (ENT) en 2 semanas.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo:

- Tiene sangre roja brillante que sale de la nariz o la boca y que no se detiene.
- Tiene vómitos con sangre color rojo brillante o un líquido similar a los sedimentos de café.
- Tiene vómitos por más de 24 horas.
- Tiene una temperatura superior a los 102 °F (38.9 °C).
- No bebe líquidos ni orina por más de 12 horas.
- Tiene cambios en la visión o hinchazón alrededor de los ojos.
- Se siente muy cansado o tiene el cuello rígido.
- Tiene una secreción constante de líquido transparente de la nariz.

- Tiene dolor de cabeza que no desaparece o que no mejora.
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Clínica de otorrinolaringología (ENT): (414) 266 2982. Después del horario de oficina, llame al (414) 266 2000 y pida que le llamen al doctor de otorrinolaringología (ENT) de guardia.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.