




# Medicamento de rescate anticonvulsivo intranasal

**Alerta:** Llame al 911 si:

- Esta es la primera vez que le da a su hijo este medicamento.
- La convulsión de su hijo continúa 5 minutos después de haber administrado la dosis.

Hable con su farmacéutico para que le dé indicaciones sobre cómo administrar el medicamento específico de su hijo.

Cómo administrar el medicamento de rescate en la nariz:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saque el paquete del medicamento de la caja.</li><li>2. Despegue la lengüeta y con cuidado saque el atomizador nasal.</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>3. Coloque suavemente el pulgar en la parte inferior del émbolo. Coloque sus dedos índice y corazón a cada lado de la boquilla. <b>No</b> presione el émbolo.</li></ol> 	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Administre la dosis:<ul style="list-style-type: none"><li>• Coloque la punta de la boquilla en una fosa nasal hasta que sus dedos índice y corazón toquen la parte inferior de la nariz.</li><li>• Empuje el émbolo firmemente en un movimiento hacia arriba.</li></ul><ul style="list-style-type: none"><li>• Retire la boquilla después de administrar la dosis.</li><li>• Tírela después de usarla.</li><li>• Si la dosis de su hijo requiere usar 2 dispositivos nasales, repita los pasos 2 al 4 usando el segundo dispositivo en la otra fosa nasal.</li></ul></li></ol>

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**