

¿Qué es la cirugía de extirpación de la glándula submandibular?

Algunos niños tienen demasiada saliva. Esto puede causar neumonía, asfixia o problemas en la piel. Esta cirugía extirpa la glándula submandibular que produce saliva. Esta glándula está debajo de la barbilla.

¿Qué necesito saber antes de la cirugía de mi hijo?

Programación

Intentamos programar la cirugía lo antes posible. Si no ha tenido noticias nuestras en 2 semanas, llame a nuestro consultorio.

Lo mejor es realizar la cirugía cuando su hijo esté sano. Si su hijo está enfermo, llame a nuestro consultorio de inmediato. Es posible que sea necesario cancelar la cirugía.

Le informarán cuándo debe su hijo dejar de comer y beber antes de la cirugía. Es muy importante que siga estas indicaciones. La cirugía de su hijo tendrá que cancelarse si no sigue esta orden.

Medicamentos

NO administre a su hijo estos medicamentos durante al menos 2 semanas antes de la cirugía:


- Ibuprofen
- Naproxen
- Aspirina

Estos medicamentos aumentan la probabilidad de sangrado durante la cirugía. Le puede administrar Tylenol según sea necesario. **NO** interrumpa ningún medicamento recetado sin hablar con su médico. Llame a nuestro consultorio si le recetan un medicamento nuevo a su hijo.

¿Qué necesito saber después de la cirugía de mi hijo?

Usted recibirá un resumen de la visita (AVS, por sus siglas en inglés) después de la cirugía. Este resumen tendrá detalles sobre:

- Cuidado de seguimiento.
- Alimentación.
- Medicamentos para el dolor después de la cirugía.
- Actividades que su hijo puede comenzar a hacer después de la cirugía. Para ayudarlo a planificar, es importante que sepa que la mayoría de las veces las actividades y la atención de seguimiento en el resumen de la visita serán como la información a continuación. El resumen de la visita de su hijo puede tener detalles de cuidado especiales solo para él y ser diferente.



Actividad

- Limite las actividades de su hijo durante los primeros días.
- Es posible que su hijo necesite quedarse en casa y no ir a la escuela ni a la guardería durante unos días.
- Su hijo puede jugar normalmente cuando mejore el dolor.
- No debe hacer deportes de contacto ni natación durante 2 semanas después de la cirugía.

ALERTA: Llame al médico, enfermera o a la clínica de otorrinolaringología (ENT, por sus siglas en inglés) si tiene alguna pregunta o inquietud o si su hijo tiene:

- Hinchazón en el cuello.
- Enrojecimiento o supuración de la zona donde se realizó la cirugía.
- Temperatura superior a 102° F.
- Necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta información.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

Esta hoja fue creada para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

**Blaesen.com staff (2014). "Medical gallery of Blaesen Medical 2014". *WikiJournal of Medicine* 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work