


¿Qué es la terapia V.A.C.[®]?

La terapia V.A.C. ayuda con la cicatrización de las heridas. Es un sistema que tiene una aspiradora suave incorporada. Esta terapia:

- Ayuda a cicatrizar la herida.
- Extrae los fluidos de la herida.
- Limita la necesidad de cambiar el vendaje a diario.



Colocación del vendaje V.A.C.

- El vendaje se coloca sobre o dentro de la herida.
- Un extremo de la sonda se conecta al vendaje. El otro extremo se conecta al recipiente que va en la unidad.
- La gasa cubre el vendaje.

Cuando se coloca el vendaje por primera vez, algunos niños sienten un tirón leve. La sensación desaparece después de unos minutos.

¿Quién cambiará el vendaje cuando mi hijo esté en el hospital?

- El médico de su hijo, un médico asistente, una enfermera especializada en práctica avanzada o una enfermera que trabaje con el médico cambiará el vendaje cuando esté en el hospital.
- El cambio de vendaje se puede realizar en la sala de operaciones o en la sala de tratamiento de la unidad.
- Los prepararán a usted y a su hijo, sin importar dónde se cambie el vendaje.

¿Quién cambiará el vendaje cuando mi hijo esté en el hogar?

- El vendaje V.A.C. de su hijo debe cambiarse cada pocos días. El resumen después de la visita (AVS, por sus siglas en inglés) le indicará con qué frecuencia debe cambiarse.
- El vendaje V.A.C. se puede cambiar:
 - En la clínica por el doctor, la enfermera, el médico asistente o la enfermera especializada en práctica avanzada.
 - En la sala de operaciones.
 - En su casa por una enfermera.
- Es posible que el médico le pida que retire el vendaje para que su hijo pueda bañarse antes de volver a colocarle un vendaje nuevo. Retire el vendaje **solo** si el médico se lo ha indicado.
- Se le informará quién cambiará el vendaje V.A.C. de su hijo.

Si el vendaje V.A.C. de su hijo se cambiará en la clínica o en la sala de operaciones, deberá traer:

- La unidad de terapia V.A.C.
- Un recipiente y una sonda adicionales.
- Vendaje adicional.

Si no se retiró el vendaje viejo en casa, dele a su hijo medicamento para el dolor antes de ir a la clínica.

¿Cómo retiro el vendaje?

Dele a su hijo medicamento para el dolor 20 minutos antes de empezar a quitarle el vendaje.

1. Reúna los materiales.
2. Eleve las abrazaderas de la sonda por encima del nivel (más alto) de la unidad de terapia.
3. Cierre la abrazadera de la sonda que va hacia el vendaje.
4. Separe la sonda del recipiente y la sonda del vendaje. Deje que el fluido restante en la sonda caiga en el recipiente.
5. Cierre la abrazadera de la sonda que va a la unidad de terapia.
6. Presione el botón THERAPY ON/OFF (ENCENDER/APAGAR LA TERAPIA) para apagar la unidad.
7. Espere 30 segundos para que la espuma se "infle".

Nota: En este momento, puede tomar una jeringa con una onza (30 mL) de agua del grifo. Conéctela a la sonda que va al vendaje. Suelte la abrazadera de la sonda y empuje el agua suavemente hacia el vendaje. Espere 15 minutos y luego continúe retirando el vendaje.

Retire la gasa jalando suavemente hacia un lado. Trate de no jalar derecho hacia arriba. Retire suavemente la espuma de la herida.

¿Puede mi hijo bañarse en casa?

- Si el vendaje está colocado, no está permitido bañarse ni meterse en la tina. Puede simplemente lavarse (como un baño de esponja).
- Algunos niños pueden bañarse en casa en los "días de cambio de vendaje". El médico de su hijo le dirá si está bien bañarse en casa.
- Si le han dicho que quite el vendaje antes de la visita a la clínica, está bien que deje que su hijo se bañe en casa antes de que le coloquen nuevamente el vendaje en la clínica.
- Consulte los pasos enumerados anteriormente para retirar el vendaje.
- No permita que su hijo se sumerja en una tina.
- Use una toalla limpia para secar la herida con palmaditas después del baño.
- Coloque un vendaje sobre la herida abierta.

ALERTA: llame al médico o enfermera de su hijo o a la clínica si tiene alguna pregunta inquietud o si su hijo tiene:

- Fiebre de 101.5 °F (38.6 °C).
- Más dolor en la herida.
- Secreción con sangre en la sonda de V.A.C.
- Pus o mal olor en la herida.
- Más enrojecimiento o la herida se siente caliente.
- Tiene necesidades especiales de atención médica que no se mencionaron en esta hoja informativa.

Llame también en los siguientes casos:

- Si tiene problemas con la máquina de terapia V.A.C.
- Si la máquina de terapia V.A.C. ha permanecido apagada por más de dos horas.

Para obtener más información sobre salud y bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWi/en/parents>

Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención médica sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.